



Közösségi halmozódás: nem jelentettek.



Morbiditás:


A morbiditás értéke Baranya megyében az 1. héten 40,6 ‰, emelkedett az 51. héthez viszonyítva.

Influenzaszerű tünetekkel rendelkező beteget nem jelentettek a Komlói Járási Hivatal illetékességi területéről. A szezon kezdete óta a tárgyhéten is a Siklói járás területén van a legmagasabb morbiditás (67,1‰), ezt követi a Pécsi, Mohácsi és a Szigetvári Járás.



Európa 52. hét intenzitás, földrajzi kiterjedés, domináló vírusok





Összefoglalás:

A 2018/2019. évi influenza szezon 1. hetében (3 munkanap) változatlanul alacsony az influenza aktivitás, de már emelkedett az influenza morbiditás megyei szinten a csonka hét ellenére.

A Komlói járásból nem jelentettek influenzaszerű beteget, a legmagasabb morbiditás hetek óta a Siklói járásban van, innen mutatták ki az 51. héten a megyében az első influenza vírust, mely az A típus volt.

Európa legtöbb országában már emelkedik a morbiditás, de csak Hollandiában és Törökországban van közepes intenzitású járvány. Az Influenza vírusok közül az A típus uralkodik, mindkét altípus jelen van.

Az influenza elleni védőoltás hatása két hét alatt alakul ki, már sürgető az oltás beadása! A rizikócsoportokon és a 60 éven felülieken kívül mindenkinek javasolt a vakcináció! Főleg a rizikócsoportokban fontos a Pneumococcus elleni védelem is!

Készítette:

Dr.Tornainé dr. Kiss Gabriella megyei tisztiorvos
Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
Népegészségügyi és Járványügyi Osztály

Javasolt honlapok:

Nemzeti Népegészségügyi Központ www.antsz.hu

Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC), Stockholm:
<https://ecdc.europa.eu/en/seasonal-influenza>

Egészségügyi Világszervezet: <http://flunewseurope.org/>